

Épillet chez le chien


Protéger votre chien des épillets en saison à risque

L'épillet est une **graine sèche de graminée** en forme de fer de lance, dont les barbules orientées vers l'arrière la font progresser dans les tissus sans pouvoir reculer. Une fois engagée dans la peau, l'oreille, la narine, l'œil ou le fourreau, elle **ne ressort pas seule** et migre en quelques heures à quelques jours, parfois jusqu'à des organes profonds (*MSD Veterinary Manual ; Frégis*). La fenêtre de risque s'étend de **mai à septembre**, avec un pic en **juin-août**. La prévention repose sur **deux gestes simples** pendant cette période : **inspecter votre chien après chaque promenade, et tondre les zones à risque** selon son profil de pelage.

Calendrier saisonnier — France métropolitaine

Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
				Risque faible	Saison à risque	Pic de risque	Pic de risque	Risque faible			

Routine post-promenade — 60 secondes, les 5 zones à inspecter



1 Oreilles	Pavillon interne, entrée du conduit auditif	<input type="checkbox"/>
2 Yeux	Sous les paupières, conjonctive, canal lacrymal	<input type="checkbox"/>
3 Narines	Entrée des fosses nasales, truffe	<input type="checkbox"/>
4 Espaces interdigités	Entre les orteils des 4 pattes, coussinets	<input type="checkbox"/>
5 Aine / fourreau / anus	Aisselles, pli inguinal, région péri-anale	<input type="checkbox"/>

Gestes complémentaires : retirer délicatement à la pince à épiler tout épillet visible *dans le pelage* (non engagé dans la peau). **Ne jamais introduire d'instrument** dans une cavité naturelle (oreille, narine, œil). En cas d'épillet partiellement enfoncé : laisser en place et consulter (*Frégis ; AFVAC*).

Tonte préventive selon le profil de votre chien

Profil de pelage / race type	Zones à tondre ou raccourcir avant l'été
Oreilles tombantes, poils longs au pavillon (<i>cocker, épagneul, springer, basset</i>)	Pavillon interne des oreilles, périphérie du conduit auditif. <i>Snood (capuchon protecteur) utile en promenade à risque.</i>
Poils interdigités fournis (<i>caniche, bichon, golden retriever, terriers à poil long</i>)	Espaces interdigités, dessous des coussinets
Poils longs ou frisés généralisés (<i>setter, briard, bouvier, golden</i>)	Aisselles, aine, région ano-génitale, fourreau
Poils ras (<i>boxer, beagle, dogue allemand</i>)	Tonte rarement nécessaire — inspection visuelle suffit

Surveillance simple — pas d'urgence

- **Léchage modéré** d'un espace interdigité sans plaie visible
 - **Boiterie légère** apparue après promenade, sans tuméfaction
 - **Grattage occasionnel** d'oreille, animal calme par ailleurs
- Surveiller 24 h. Si aggravation ou signe ci-contre : consulter.

⚠ Signes d'alerte — consulter rapidement

- **Œil fermé, rouge, larmoiement brutal** → consultation *immédiate*
- **Secouements de tête violents, tête penchée** → dans la journée
- **Éternuements en rafale**, écoulement nasal unilatéral → avant 24 h
- **Tuméfaction interdigitée, orifice cutané suintant** → dans la journée
- **Fièvre, abattement, refus de manger** après exposition aux herbes hautes → immédiate

Mesures complémentaires en saison à risque

- **Éviter les zones à herbes hautes sèches** : bords de chemins ruraux, friches, talus non fauchés (privilégier sentiers larges, sous-bois, plages, terrains tondu).
- **Entretien votre jardin** : tondre *avant la montée en graines* des graminées (avril-mai), maintenir une coupe régulière jusqu'à fin septembre.
- **Pas d'automédication** : aucun médicament humain (ibuprofène, paracétamol, aspirine) — toxicité avérée chez le chien (*CNITV*).

Cette fiche ne remplace pas une consultation vétérinaire. Chaque chien est unique ; en cas de doute, contactez votre vétérinaire traitant.